


**Mond
Kaak
Aangezichtschirurgie**
Midden Nederland

Bovenkaakverbreding

(Transpalatinale Distractie)

MKA Chirurgen:

Philip Broers (*kaakchirurg*)

Erwin Kruizinga (*kaakchirurg, implantoloog**)

Carla Robben (*kaakchirurg*)

Jan Willem de Ruiter (*kaakchirurg, implantoloog**)

Márton Vidra (*kaakchirurg, implantoloog**)

Albert Wittkamp (*kaakchirurg, oncoloog*)

* NVOI geregistreerd



Bovenkaakverbreding d.m.v Transpalatinale Distractie (TPD).


U heeft net een gesprek gehad met uw kaakchirurg. Deze heeft u uitgelegd dat u mogelijk in aanmerking komt voor een kaakcorrectie.

Het TPD-apparaat

De plaatselijke verdoving is na twee tot vier uur uitgewerkt. U kunt dan pijn krijgen. Deze is goed te bestrijden door het innemen van pijnstillende middelen, waarvoor u een recept hebt meegekregen. Het beste kunt u met de pijnstillers beginnen voordat de plaatselijke verdoving volledig is uitgewerkt.

Vorbereiding

Het aanbrengen van de distractor vindt plaats onder narcose in dagbehandeling. Ter voorbereiding op de operatie heeft u een afspraak met de anesthesioloog op het pre-operatief spreekuur. De anesthesioloog onderzoekt u en bespreekt met u de narcose. Op de dag van opname komt u nuchter. Dit betekent dat u de dag voor de opname vanaf 24.00 uur niets meer mag eten of drinken.



Een week na de ingreep komt u voor controle bij de kaakchirurg, hij zal u dan instrueren hoe u het apparaatje moet aandraaien. Dit is doorgaans niet pijnlijk. U krijgt hiervoor een sleuteltje mee, waarmee u dagelijks het apparaatje van boven naar beneden moet aandraaien tot een volgende kleurcode verschijnt. Het sleutelen duurt een paar weken, al naar gelang de hoeveelheid verbreding die nodig is.

Het apparaat wordt onder plaatselijke verdoving verwijderd, ongeveer 4 tot 6 maanden na het plaatsen ervan.

Pijn en zwelling.

Deze is goed te bestrijden met pijnstillers. De arts geeft u hiervoor een recept mee. Na de operatie zwellen uw wangen wat op. Deze zwelling zal na 3 á 4 dagen het grootst zijn en daarna weer langzaam gaan slinken. Dit is een normaal gevolg van de ingreep. Op de dag van de ingreep en de dag er na kan er nog wat bloed uit uw neus of mond komen. Dit is normaal en gaat vanzelf over. Ook kan u een blauwe plek op de wang of in de hals krijgen, deze verdwijnt vanzelf in de weken na de behandeling.

Verdere verzorging.

De eerste week mag u uw neus niet snuiten, maar alleen afvegen of ophalen. Als u moet niezen moet u met open mond niezen. Dit is belangrijk om te voorkomen dat u een te groot drukverschil opbouwt tussen uw neusbijholte en uw mondholte. De eerste twee dagen na de ingreep kunt u beter uw tanden niet poetsen. Daarna mag u dat weer voorzichtig gaan doen. Om uw mond goed te reinigen krijgt u een recept mee om bij de apotheek een mondspoelvloeistof (Chloorhexidine) af te halen. Hiermee kunt u de eerste week twee maal per dag uw mond spoelen. Omdat uw bovenkaak door de operatie tijdelijk is verzwakt, is het verstandig om de eerste paar weken zacht voedsel te gebruiken.

Roken.

Het is voor de wondgenezing beter om de eerste dagen na de operatie niet te roken.

Wanneer bellen?

Als de zwelling of de pijn na drie dagen erger wordt in plaats van minder, is het verstandig om contact met ons op te nemen.

Natuurlijk kunt u ons ook altijd bellen wanneer u vragen hebt of als u zich ongerust maakt.

De telefoonnummers staan vermeld op uw ziekenhuiskaart in het mapje van de ponskaart. Voor spoedgevallen kunt u het algemene telefoonnummer van ziekenhuis bellen,

Lees ook onze speciale nazorg folder!

Ziekenhuis Meander Medisch Centrum Amersfoort:

Locatie Elisabeth, Ringweg randenbroek 110
3818 CP Amersfoort
Tel. Algemeen: 033 - 850 5050 Afspraken: 033 - 850 60 70

Ziekenhuis St Jansdal:

Wethouder Jansenlaan 90
3844 DG Harderwijk
Tel. Algemeen: 0341 - 463911 Afspraken: 0341 - 463890

Meer informatie vind u op :
www.mkamidnederland.nl